

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

ロフレックス®

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、悪心・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能 ・ 効 果

- 次の諸症状の緩和

神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労

- 脚気

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

- 次の場合のビタミンB₁の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用 法 ・ 用 量

次の量を食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	3錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

[用法・用量に関する注意]

用法・用量を守ってください。

成分・分量

9錠（1日服用量）中

成分	分量
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	900mg
チアミン硝酸物（ビタミンB ₁ 硝酸塩）	30mg
ガンマオリザノール	10mg

添加物としてグルコサミン塩酸塩、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かないところに保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変化するおそれがあります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから、開封後は捨ててください。
- (6)水分が錠剤につくと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れたものを容器に戻さないでください。
- (7)開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、下記にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

ワダカルシウム製薬株式会社 お客様相談窓口

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南2-7-36

電話：06-6965-0051（土・日・祝日は除く）

受付時間：9時～12時、13時～17時



ワダカルシウム製薬株式会社

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南2-7-36